

Pyrzyce, dnia 29 marca 2023r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje, iż teren powiatu pyrzyckiego został podzielony na dwie strefy, w związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń, ASF.

Strefa objęta ograniczeniami II, tzw. różowa obejmuje gminę Kozielice.

Strefa objęta ograniczeniami I, tzw. niebieska obejmuje gminy Przelewice, Lipiany, Pyrzyce, Bielice.

Każde gospodarstwo utrzymujące świnie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji

W strefie różowej każda planowana przesyłka zwierząt (do rzeźni oraz do hodowli) musi zostać zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach za pomocą pisemnego wniosku na podstawie którego zostanie wydana zgoda – decyzja PLW na przesyłkę zwierząt.

Pragnę tutaj zaznaczyć, że dopiero po uzyskaniu decyzji PLW urzędowy lekarz weterynarii wystawi świadectwo zdrowia.

W strefie różowej każdy ubój na użytek własny (w gospodarstwie) musi być poprzedzony badaniem przedubojowym, oznacza to konieczność zgłaszania uboju na użytek własny na minimum 72 godziny od planowanej daty uboju.

Przypominam o konieczności sporządzenia i zatwierdzenia u PLW w Pyrzycach planu bezpieczeństwa biologicznego .

Z poważaniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach

POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII
w Pyrzycach
lek. wet. Krzysztof Dankiewicz

Pyrzyce, dnia.....

imię i nazwisko

adres

telefon

adres e mail

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej

Proszę o wyrażenie zgody na przemieszczenie..... sztuk trzody chlewnej z gospodarstwa..... położonego w (adres) nr siedziby stada..... rodzaj obszaru objętego ograniczeniami: NIEBIESKI 1/ RÓŻOWY 11/ CZERWONY III¹ do rzeźni/gospodarstwa¹(nazwa) położonej/ położonego w (adres)

rodzaj strefy: WOLNA/NIEBIESKI 1/ RÓŻOWY II/ CZERWONY III¹ WNI rzeźni/ Nr siedziby stada miejsca przeznaczenia L..... Aktualny stan pogłowa świń w gospodarstwie wynosi..... Aktualny stan pogłowa świń w budynku, z którego ma nastąpić przemieszczenie²..... Planowany termin przemieszczenia trzody chlewnej.....

Oświadczam, że:













Przemieszczane świny przebywały w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna Świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa lub jednostek produkcyjnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

(podpis)

- 1, niepotrzebne skreślić
 - 2, w przypadku utrzymywania zwierząt w kilku budynkach inwentarskich
-

WALKA Z ASF

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?

	Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt wolno żyjących.
	Karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt.
	Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia).
	Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich.
	Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
	Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia, wykorzystywanych jako ściółka dla świń.
	Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt, w zbieraniu runa leśnego oraz w innych pracach lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 72 godzinnej kwarantanny, bez kontaktu ze świniami.
	Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków inwentarskich poprzez zainstalowanie odpowiednio utrzymanych i nasączonych środkami dezynfekcyjnymi mat dezynfekcyjnych.
	Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
	Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn oraz narzędzi rolniczych, które mogą przenosić wirusa ASF.
	Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
	Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszeniu wirusa ze środowiska do gospodarstwa.